

## Uwaga Hodowcy Drobiu

**W celu ochrony stad drobiu przed zachorowaniem na wysoce zjadliwą grypą ptaków należy ograniczyć możliwość przeniesienia wirusa z dzikiego ptactwa, szczególnie migrującego ptactwa wodnego na drób domowy. Wirus może też być przeniesiony z innego zarażonego stada drobiu:**

W tym celu należy:

- a) utrzymywać kaczki i gęsi oddzielone od innych gatunków drobiu,
- b) nie utrzymywać drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
  - drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem i jego odchodami za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;
  - drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.
- c) Należy zachować zasady bioasekuracji, tzn. wyłożyć maty dezynfekcyjne, używać obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu, stosować odzież ochronną, każdorazowo przy wejściu i wyjściu na teren, gdzie przebywa drób odkażać ręce i obuwie ochronne.
- d) Zabrania się:
  - korzystać ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu;
  - pić drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;
  - gromadzić drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ZŁOTORYI

  
lek. wet. Tomasz Orzłowski